

**Observações:**

Utilizar seringas e agulhas estéreis e descartáveis.

Não vacinar animais enfermos, subnutridos, parasitados ou sob condições de stress.

Como todo produto biológico, podem surgir reações de hipersensibilidade, que deverão ser imediatamente tratadas de acordo com a orientação do Médico-Veterinário.

A vacinação deverá ser precedida de um minucioso exame clínico realizado por um Médico-Veterinário. Em caso de reação anafilática administrar epinefrina ou equivalente.

O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e na manutenção da resposta imune após a vacinação.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Conservar entre 2° C e 8 °C.

**Apresentações:**

Embalagens coletivas contendo 10 ou 20 frascos de 1 mL da vacina pronta para uso.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8519 em 03/04/2003.

**Proprietário e Fabricante:**

Ceva Saúde Animal

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rod. MG 050, nº2001 - Distrito Industrial

Juatuba/MG - CEP: 35675-000

CNPJ: 07.086.487/0001-16

**Responsável Técnico:**

Gustavo Montaldi Carvalho

CRMV/MG 13.060



PS0398 V301

# Hertaliq®

## VACINA INATIVADA CONTRA A RAIVA



Suspensão de vírus rábico, fixo, CEPA PV, replicado em linhagem celular de rim de hamster inativada e adicionada de adjuvante e conservante.

### Composição:

Cada 1 mL contém:

Suspensão de vírus rábico, amostra PV, inativado pela beta-propiolactona, com título mínimo de $10^{4.0}$ DL <sub>50</sub> /0,03 mL .....	0,90 mL
Gel de hidróxido de alumínio.....	0,10 mL
Mertiolate (thimerosal).....	0,000167 g

### Indicação:

Prevenção da raiva canina e felina.

### Modo de usar:

Aplicar via intramuscular ou subcutânea, em caninos e felinos, a partir de 4 meses de idade. Revacinar anualmente.