

# Altresyn®

## USO VETERINÁRIO

Progestágeno oral para a sincronização do cio de fêmeas suínas

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA**

### SUÍNOS:

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.**

Conteúdo líquido:

**540 ml**



## FÓRMULA:

Cada 100,0 mL de produto contém:

Altrenogest ..... 0.4 g  
Excipientes. q.s.p ..... 100,0 mL

## INDICAÇÕES:

Altresyn® é indicado para a sincronização do estro de fêmeas suínas sexualmente maduras (marrãs ou porcas adultas). Indicado também para melhorar o manejo reprodutivo da granja, uma vez que facilita a formação dos lotes para reprodução.

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Aplicar sobre a ração dos animais imediatamente antes do arraçoamento.

### Calibração da válvula dosadora:

Coloque o frasco na posição horizontal; com o bocal do dosador apontando para cima, pressione o gatilho lentamente até que uma gota do produto apareça na ponta do dosador. A partir daí o dosador liberará 5 mL de produto para cada ativação do gatilho.

## POSOLOGIA E INTERVALO DE APLICAÇÕES:

Marrãs: O produto deve ser administrado na dose de 20 mg de altrenogest (equivalente a 5 mL de Altresyn®) por animal por dia, durante 18 dias consecutivos, para consumo imediato através da dispersão superficial sobre o alimento.

Porcas adultas: O produto deve ser administrado na dose de 20 mg de altrenogest (equivalente a 5 mL de Altresyn®) por animal por dia, por 3 a 18 dias consecutivos, para consumo imediato através da dispersão superficial sobre o alimento.

## **MODO DE AÇÃO:**

Progestágenos como altrenogest são utilizados para sincronizar o estro de fêmeas suínas sexualmente maduras. O tratamento oral recomendado com Altresyn® produz o estro entre 5 e 6 dias após o seu término. Esse efeito ocorre em função da inibição da hipófise pelo altrenogest impedindo a liberação de gonadotrofinas durante o tratamento. Após o fim do tratamento, o efeito inibitório é interrompido e as gonadotrofinas estimulam o crescimento rápido e sincronizado de uma nova onda folicular, que culmina na ovulação. Os animais tratados devem ser observados para detecção do cio entre 4 e 8 dias após o fim do tratamento.

## **REAÇÕES ADVERSAS:**

Garantir que a dose correta seja administrada diariamente, uma vez que a subdosagem poderá provocar a formação de cistos foliculares nos animais tratados.

Em estudos feitos com Altresyn®, não foram observadas reações adversas severas nos animais que receberam até três vezes a dose recomendada (20 mg de altrenogest por animal).

## **PRECAUÇÕES GERAIS:**

- Evitar contato direto com a pele.
- Derrames acidentais na pele ou nos olhos devem ser lavados com água limpa abundante.
- Lavar as mãos após manuseio do produto.
- Mulheres grávidas ou em período de amamentação devem evitar contato com o produto.
- Pessoas que sofrem de tumores dependentes de progesterona ou desordens tromboembólicas não devem manusear o produto.

## **Precauções de uso nos animais:**

- Adicionar o produto ao alimento imediatamente antes do arraçoamento. Sobras da alimentação medicada devem ser descartadas.
- Utilizar somente em fêmeas sexualmente maduras que tenham expressado pelo menos um cio.
- Não administrar em machos.
- Não administrar em animais prenhes.

### **Precauções especiais:**

- Sobras de alimento devem ser descartadas com segurança e não oferecidas a nenhum outro animal.

### **PERÍODO DE VALIDADE:**

O produto tem validade de 3 anos após a data de fabricação.

Após aberto, o produto deve ser consumido em até 9 semanas.

### **APRESENTAÇÕES:**

Frasco de 540 mL, contendo válvula dosadora.

**Conservar entre 15°C e 30°C, em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.**

**Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº SP000128-0.000004 em 17/04/2019.

### **Proprietário e fabricante:**

Ceva Santé Animale, Zone industrielle Très-le-bois, 22600, Loudéac - França.

### **Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:**

Ceva Saúde Animal Ltda., Rua Manoel Joaquim Filho, 303, Santa Terezinha, Paulínia, SP. – CEP 13.148-115

CNPJ: 03.224.570/0001-53



**CEVA SAC:**

0800-770-0355

sac@ceva.com

Responsável Técnica: Laura Lorenzetti Jorge – CRMV/SP nº 29.505.

**PRODUTO IMPORTADO**