



# CIRCOVAC®

Vacina inativada, contendo adjuvante oleoso, para a prevenção da circovirose suína causada pelo circovírus suíno tipo 2  
**USO VETERINÁRIO**

Suspensão e emulsão injetáveis

## COMPOSIÇÃO

Cada dose de 2 mL reconstituída, contém:

Circovírus suíno tipo 2 (PCV2) inativado .....  $\geq 2,1 \log_{10}$  Unidades ELISA  
Tiomersal ..... 0,20 mg  
Excipiente oleoso ..... q.s.p. 1 dose de 2 mL

## INDICAÇÃO

CIRCOVAC® pode ser aplicada para imunização ativa de leitões quando o manejo de colostro for deficiente, ou quando as porcas não puderam ser vacinadas, ou em suínos de engorda advindos de fêmeas sem histórico definido de vacinação e para o controle de surtos de circovirose a campo, quando uma vacinação em massa for necessária.

Através da imunização materna, proteger passivamente os leitões via colostro, contra a circovirose suína, reduzindo a excreção viral, diminuindo os sintomas clínicos e lesões causadas pelo circovírus suíno tipo 2.

CIRCOVAC® também está indicada na prevenção de problemas reprodutivos nas fêmeas, causados pelo circovírus suíno tipo 2.

Em leitões, a CIRCOVAC® também é indicada na forma misturada com a vacina HYOGEN®, em uma única aplicação.

**PRECAUÇÕES:** Não são conhecidas. Quando CIRCOVAC® é misturada com HYOGEN®, vacinar apenas leitões de 3 semanas de idade.

## REAÇÕES ADVERSAS

A vacina pode provocar edema transitório e ligeira reação local sem qualquer efeito sobre a saúde e reprodução das porcas, e pode, excepcionalmente, provocar reações de hipersensibilidade que devem ser tratadas sintomaticamente.

Caso ocorra qualquer efeito grave ou não mencionado nesta bula, solicitamos que informe ao seu médico veterinário.

Quando a CIRCOVAC® é misturada com HYOGEN®, a segurança das vacinas misturadas é similar à das vacinas utilizadas individualmente. A bula do produto HYOGEN® deve ser consultada antes da administração da mistura de CIRCOVAC® e HYOGEN®.

**ESPÉCIES DE DESTINO:** Suína (Porcas, Marrãs e Leitões)

## DOSE, VIA(S) E FORMA(S) DE ADMINISTRAÇÃO:

### RECOMENDAÇÃO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO CORRETA

Misture bem o conteúdo total de um frasco de CIRCOVAC® suspensão com o conteúdo total da CIRCOVAC® emulsão.

Aplique corretamente através do uso de equipamento apropriado, graduando o volume necessário da dose.

Estudos de segurança e eficácia demonstraram que CIRCOVAC® pode ser misturada com HYOGEN® e administrada a leitões em apenas uma aplicação.

### ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA APLICAÇÃO APENAS DE CIRCOVAC®:

Esquema de vacinação em marrãs e porcas:

Para o desenvolvimento de proteção colostrar passiva dos leitões e prevenção de problemas reprodutivos ligados ao circovírus suíno tipo 2, aplicar uma dose de 2 mL da vacina reconstituída, por via intramuscular, de acordo com o seguinte esquema de vacinação:

**Primovacinação:** Duas vacinações com intervalo de 3 a 4 semanas, com a segunda vacinação pelo menos 2 semanas antes da cruzar (para marrãs) e pelo menos 2 semanas antes da parição (para porcas).

**Reforço:** Uma dose a cada gestação (pelo menos, 2 a 4 semanas antes da parição). É de critério do Médico Veterinário a adoção do programa de vacinação de leitões e a definição do seu protocolo de uso.

Esquema de vacinação em leitões (imunização ativa):

Aplicar apenas uma dose de 0,5 mL (1/4 da dose indicada para adultos) da vacina reconstituída por leitão a partir de 3 semanas, por via intramuscular, nas seguintes condições estritas:

- 1- Quando as fêmeas não forem vacinadas no pré-parto,
- 2- Quando as fêmeas forem vacinadas no pré-parto e o manejo do colostro for ineficiente,
- 3- Quando a origem dos animais é desconhecida, bem como o histórico de vacinação das porcas,
- 4- Quando se enfrentam surtos de circovirose e se exige vacinação em massa.

### ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA CIRCOVAC® QUANDO MISTURADA COM HYOGEN®:

O uso de misto de CIRCOVAC® com HYOGEN® está restrito à apresentação de 100 doses (200 mL) de HYOGEN® e à apresentação de 100 doses (50 mL de vacina reconstituída) de CIRCOVAC®. A bula do produto HYOGEN® deve ser consultada antes da administração da mistura de CIRCOVAC® e HYOGEN®.

Vacinação em leitões a partir de 3 semanas de idade:

CIRCOVAC®	HYOGEN®
100 doses para leitões (50 mL de suspensão reconstituída + emulsão)	100 doses (200 mL da vacina)



Prepare CIRCOVAC® agitando vigorosamente o frasco de suspensão de antígeno e injetando o conteúdo de suspensão no frasco de emulsão contendo adjuvante.

Misturar 50 mL de CIRCOVAC® e 200 mL de HYOGEN® e agitar suavemente até obter uma emulsão branca homogênea.

Administrar uma dose de 2,5 mL da mistura por injeção intramuscular, na lateral do pescoço.

Use toda a mistura de vacina imediatamente após a mistura.

Os dispositivos para a vacinação devem ser usados em condições assépticas e de acordo com as instruções dos dispositivos fornecidas pelo fabricante.

**PERÍODO DE CARÊNCIA:** Zero.

### **PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO**

Manter fora do alcance de crianças.

Conservar e transportar sob refrigeração (2°C - 8°C), protegida da luz.

Utilizar até 3 horas depois de reconstituída.

Não utilizar após a data de vencimento (vide rótulo).

Quando CIRCOVAC® é misturada com HYOGEN® use toda a mistura de vacina imediatamente após a preparação.

### **ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL(ES)**

Utilizar o manejo de rotina para vacinar os animais.

Utilizar os procedimentos usuais de assepsia.

Pode ser aplicada durante a gestação.

Nenhuma interação conhecida.

Os efeitos adversos estão descritos no parágrafo "Reações Adversas"; foram observados somente após a administração de uma dose dupla da vacina.

Não misture com nenhum outro medicamento, exceto com a HYOGEN®.

Pode ser usado em leitões (ver instruções), associado ou não com a vacinação de fêmeas.

### **AVISOS**

#### **Ao usuário:**

Como este produto contém óleo mineral, sua injeção acidental pode provocar dor aguda e inflamação, particularmente se for injetado em uma articulação ou dedo. Caso não receba tratamento médico adequado, pode, raramente, evoluir para perda do dedo afetado.

Em casos de acidentes, deve-se procurar imediatamente atendimento médico, mesmo quando for injetada uma dose muito pequena. Leve sempre a bula do produto.

Se a dor persistir por mais de 12 horas após o exame médico, deve-se procurar atendimento médico novamente.

#### **Ao médico:**

Este produto contém óleo mineral, sua injeção acidental, mesmo que em quantidades muito pequenas, pode causar inflamação intensa, que pode evoluir para necrose isquêmica, podendo até levar a perda do dedo afetado. Deve-se encaminhar o paciente **IMEDIATAMENTE** a um atendimento cirúrgico especializado, pois pode ser necessária a intervenção cirúrgica precoce para irrigação da área afetada, sobretudo, se forem afetados dedos ou tendões.

### **PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO NÃO UTILIZADO OU SEUS RESÍDUOS**

Todo produto não utilizado ou seus resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

A vacina contém um circovírus suíno inativado de tipo 2 (PCV2) e adjuvante oleoso e é indicada para vacinação de marrãs, porcas e leitões, visando a imunização ativa dos leitões ou passiva (via colostro).

A vacina reduzirá os sinais clínicos e a infecção provocados pelo circovírus suíno tipo 2, agente causador da SDMSD (Síndrome Definhante Multissistêmica de Suínos Desmamados).

A bula do produto HYOGEN® deve ser consultada antes da administração da combinação de CIRCOVAC® e HYOGEN®.

Não há informação disponível sobre a segurança e eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário, exceto quando misturado com HYOGEN®. Portanto, a decisão de usar esta vacina antes ou depois de qualquer outro medicamento veterinário deve ser tomada caso a caso.

### **APRESENTAÇÕES**

Dois frascos, um contendo a suspensão antigênica (fase aquosa) e outro contendo a emulsão (óleo em água sem o princípio ativo), contendo 5, 25 e 50 doses de 2,0 mL ou 20, 100 e 200 doses de 0,5 mL.

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

**Validade do Produto:** 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da fabricação.

**Proprietário:** Ceva Santé Animale - 10 av., de la Ballastière - 33500 Libourne - França.

**Fabricante:** Ceva-Phylaxia - Hungria.

**Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:**

Ceva Saúde Animal - Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP - CEP: 13.148-115

CNPJ: 07.086.487/0014-30

Licenciado no MAPA sob nº 9.257/2006 em 28/12/2006.

Resp. Técnica: Laura Lorenzetti Jorge - CRMV/SP 29.505

### **PRODUTO IMPORTADO**

