



HYOGEN

Vacina inativada para a imunização de suínos
contra *Mycoplasma hyopneumoniae*

USO VETERINÁRIO

56683-03

COMPOSIÇÃO

Preparada a partir do cultivo de *Mycoplasma hyopneumoniae* inativado, combinada com o adjuvante oleoso J5 de propriedade da Ceva denominado IMUVANT® e timerosal como preservativo.

INDICAÇÕES

Para imunização ativa de suínos contra a Pneumonia Enzoótica dos Suínos causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM

Por via intramuscular sob condições assépticas.

Vacinação apenas com HYOGEN®:

Dosagem:

- Administrar dose única de 2 mL em suínos de 21 dias.
- Em caso de infecções precoces é opcional administrar duas vezes a dose de 1 mL, a partir da primeira semana de vida. A segunda dose deve ser administrada com 2-3 semanas de intervalo.

Vacinação de HYOGEN® quando misturada com CIRCOVAC®:

O uso conjugado de HYOGEN® com CIRCOVAC® está restrito à apresentação de 100 doses (200 mL) de HYOGEN® e à apresentação de 100 doses (50 mL de vacina reconstituída) de CIRCOVAC®. A bula do produto CIRCOVAC® deve ser consultada antes da administração da mistura de CIRCOVAC® e HYOGEN®.

Vacinação de leitões a partir de 3 semanas de idade:

CIRCOVAC®	HYOGEN®
100 doses para leitões (50 mL de suspensão reconstituída + emulsão)	100 doses (200 mL da vacina)

Prepare CIRCOVAC® agitando vigorosamente o frasco de suspensão de antígeno e injetando o conteúdo de suspensão no frasco de emulsão contendo adjuvante.

Misturar 50 mL de CIRCOVAC® e 200 mL de HYOGEN® e agitar suavemente até obter uma emulsão branca homogênea. Administrar uma dose de 2,5 mL da mistura de HYOGEN® com CIRCOVAC® por injeção intramuscular, na lateral do pescoço dos leitões, a partir das 3 semanas de idade.

Use toda a mistura de vacinas imediatamente após a combinação.

Os dispositivos para a vacinação devem ser usados em condições assépticas e de acordo com as instruções dos dispositivos fornecidas pelo fabricante.

PRECAUÇÕES GERAIS

Administrar somente em animais saudáveis. Usar equipamento estéril para injeção.

Antes da aplicação manter a vacina na temperatura ambiente (15°C a 25°C). Agitar bem o frasco antes de usar.

Caso a vacina for acidentalmente infectada ao operador, cuidados médicos urgentes são requeridos.

Manter fora do alcance de crianças.

Restos de produto devem ser descartados conforme legislação vigente.

Validade do produto: 24 (vinte e quatro) meses.

CONSERVAÇÃO

Entre 2°C e 8°C. Não congelar.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no MAPA sob nº 9,725/2013 em 22/03/2013.

Responsável Técnica: Laura Lorenzetti Jorge - CRMV/SP 29.505

Proprietário e Fabricante:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

I 107 Budapest, Szállás u.5. - Hungria

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

Ceva Saúde Animal

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Santa Terezinha

Paulínia/SP - CEP: 13.148-115

CNPJ: 07.086.487/0014-30



PRODUTO IMPORTADO